

STATISTIQUES DES ENFANTS ET DES FEMMES EN RDC, 2010

(Définitions : voir page 2)

Indicateurs de Base

Population totale ¹ :	69 058 940
Nombre annuel de naissances :	2 824 389
Nombre annuel des décès de moins de 5 ans :	403 719
Taux de mortalité infantile (- de 1 an) (sur 1000 naissances vivantes) :	97
Taux de mortalité des moins de 5 ans (sur 1000 naissances vivantes) :	158
Taux de mortalité néonatale, 2004 :	47

Indicateurs démographiques

Population de moins de 18 ans ¹ (54%) :	37 291 828
Population de moins de 5 ans ¹ (18.9%) :	13 052 140
Taux annuel d'accroissement démographique, 2007 :	2.9
Taux brut de natalité, 2007 :	50
Taux brut de mortalité, 2007 :	18
Espérance de vie, 2007 :	46
% de la population urbanisée :	30

Indicateurs économiques

Revenu national brut par habitant (\$US), 2007 :	140
--	-----

Santé

% de vaccins PEV payés par l'Etat :	0
% d'enfants d'1 an immunisés contre la TB (BCG) :	84
% d'enfants d'1 an vaccinés 3 fois contre la Diphtérie, la Coqueluche et le Tétanos (DTC3) :	61
% d'enfants d'1 an immunisés contre la Polio :	58
% d'enfants d'1 an immunisés contre la Rougeole :	67
% de - de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire :	39
% de - de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide :	38

Nutrition

% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance :	10
% d'enfants nourris au sein exclusivement (- de 6 mois) :	37
% d'enfants nourris au sein plus aliments de sevrage (6-9 mois) :	87
% d'enfants nourris au sein encore allaités (20-23mois) :	53
% d'enfants de - de 5 ans souffrant d'insuffisance pondérale modérée et grave (P/A) (NCHS/OMS) :	24
% d'enfants de - de 5 ans souffrant d'insuffisance pondérale grave (P/A) :	8
% d'enfants de - de 5 ans souffrant de sous-nutrition aiguë modérée et grave (émaciation) (P/T) :	9
% d'enfants de - de 5 ans souffrant de sous-nutrition chronique modérée et grave (retard de croissance) (T/A) :	43
% de ménages consommant du sel iodé :	57
Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6-59 mois) (couverture totale) :	82

VIH/SIDA

Taux de prévalence chez les adultes (15-49 ans) ² :	-
Nombre estimatif de personnes vivant avec le VIH Adultes & enfants, 2005 :	400-500 000
% de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler du SIDA :	89
% de femmes de 15-49 ans ayant une connaissance approfondie de la prévention du SIDA :	15
% de femmes de 15-49 ans ayant une connaissance de la transmission du SIDA de la mère à l'enfant :	37

Education

Taux d'alphabétisation des jeunes hommes (15-24 ans), 2007 :	78
Taux d'alphabétisation des jeunes femmes (15-24 ans) :	51
Taux net de fréquentation dans le primaire, garçons :	78
Taux net de fréquentation dans le primaire, filles :	72
% d'enfants atteignant la 5ème année d'études primaires, données de l'enquête :	91
Taux d'alphabétisation des adultes (15 ans et +), 2007 :	67



Unicef RDC/2010

Femmes

Indice synthétique de fécondité :	6.3
Taux de couverture pour les soins prénatals :	44
% d'accouchements assistés par du personnel soignant qualifié :	74
Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) (ratio ajusté), 2005 :	1 100
Risque de décès maternel sur la vie entière, 2005.	1 sur 13

Protection de l'Enfant

% d'enfants (5-14 ans) faisant un travail néfaste total :	42
% des garçons (5-14 ans) faisant un travail néfaste :	36
% des filles (5-14 ans) faisant un travail néfaste :	48
% d'enregistrement des naissances total :	28
% d'enregistrement des naissances en milieu urbain :	24
% d'enregistrement des naissances en milieu rural :	29

Eau-Assainissement-Environnement

% pop. totale utilisant des sources d'eau potable améliorées (EPA) :	47
% pop. en milieu urbain utilisant des sources EPA :	83
% pop. en milieu rural utilisant des sources EPA :	31
% pop. tot. ayant accès à un assainissement adéquat :	14
% pop. en milieu urbain ayant accès à un assainissement adéquat :	36
% pop. en milieu rural ayant accès à un assainissement adéquat :	4
% d'enf. de - de 5 ans qui ont eu de la diarrhée dans les deux semaines auparavant :	18

¹ Toutes les données sont tirées de l'enquête par grappes à indicateurs multiples - MICS 2010 sauf les données avec indication 2004, 2005 ou 2007 qui proviennent de «LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 2009».

² L'Enquête Démographique et de Santé (EDS 2007) démontre une prévalence de 1,3% pour la population de 15-49 ans. Ce taux n'est pas reconnu officiellement. La collecte de données démontre des taux de prévalence comme 4,1% auprès de femmes enceintes dans 24 sites sentinelles ruraux/urbains (UNICEF RDC 2007).

DEFINITIONS

Taux de mortalité infantile	Probabilité de décéder entre la naissance et le premier anniversaire, pour 1 000 naissances vivantes.
Taux de mortalité des - de 5 ans	Probabilité de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire, pour 1 000 naissances vivantes.
Taux de mortalité néonatale	Probabilité de décéder au cours des 28 premiers jours de la vie, exprimée pour 1 000 naissances vivantes.
Taux brut de natalité	Nombre annuel de naissances pour 1 000 habitants.
Taux brut de mortalité	Nombre annuel de décès pour 1 000 habitants.
Espérance de vie à la naissance	Nombre d'années que vivrait un enfant nouveau-né s'il était exposé aux risques de mortalité qui prévalent dans son groupe de population au moment de la naissance.
Population urbaine	Pourcentage de la population résidant dans les régions urbaines telles qu'elles ont été définies par des critères nationaux lors du dernier recensement.
RNB par habitant	Le revenu national brut (RNB) est la somme de la valeur ajoutée par tous les producteurs résidents, majorée des taxes (subventions en moins) non incluses dans l'évaluation des produits ainsi que des recettes nettes des revenus primaires provenant du reste du monde (rémunérations des employés et revenus de la propriété). Le RNB par habitant correspond au revenu national brut divisé par le nombre d'habitants au milieu de l'année. La conversion du RNB par habitant en dollars des E.-U. s'effectue selon la méthode utilisée pour l'Atlas de la Banque Mondiale.
Financement des vaccins par l'Etat	Pourcentage des vaccins systématiquement administrés dans un pays pour protéger les enfants qui est payé par l'Etat (prêts compris).
BCG	Pourcentage de nourrissons qui ont reçu le BCG (Bacille de Calmette et Guérin), vaccin contre la tuberculose.
DTC3	Pourcentage de nourrissons qui ont reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.
% de moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire	Pourcentage d'enfants (âgés de 0 à 4 ans) qui dorment sous une moustiquaire.
% de moins de 5 ans qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide	Pourcentage d'enfants (âgés de 0 à 4 ans) qui dorment sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide.
Insuffisance pondérale à la naissance	Nouveau-nés pesant moins de 2 500 grammes.
Insuffisance pondérale	Modérée et grave: pourcentage d'enfants 0-59 mois dont le poids est inférieur de deux écarts-types au poids médian pour leur âge de la population de référence du National Center for Health Statistics (NCHS)/OMS; grave: pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de trois écarts-types au poids médian pour leur âge de la population de référence du NCHS/OMS.
Emaciation	Modérée et grave: pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids pour la taille est inférieur de deux écarts-types au poids pour la taille médian de la population de référence du NCHS/OMS.
Retard de croissance	Modéré et grave: pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont la taille pour l'âge est inférieure de deux écarts types à la taille pour l'âge médiane de la population de référence du NCHS/OMS.
Consommation de sel iodé	Pourcentage de foyers consommant une quantité adéquate de sel iodé (15 parties par millions ou plus).
Vitamine A	Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu une supplémentation en vitamine A en 2005.
Estimation du taux de prévalence du VIH chez les adultes	Pourcentage d'adultes (âgés de 15 à 49 ans) vivant avec le VIH fin 2005.
Femmes de 15-49 ans ayant entendu parler du SIDA:	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont déjà entendu parler du SIDA (soit à propos de la transmission, de la prévention ou autre).
Femmes de 15-49 ans ayant une connaissance approfondie de la prévention du SIDA	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui connaissent comment le VIH/SIDA se transmet, comment il ne peut pas se transmettre et les méthodes de prévention.
Femmes de 15-49 ans ayant une connaissance de la transmission du SIDA de la mère à l'enfant	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui savent que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant lors de l'accouchement.
Taux d'alphabétisation des jeunes	Nombre de jeunes personnes alphabétisées, âgées de 15 à 24 ans, exprimé en pourcentage de la population totale dans cette catégorie d'âge.
Taux net de fréquentation scolaire dans le primaire	Nombre d'enfants fréquentant l'école primaire ou secondaire ayant l'âge officiel de suivre des études primaires, exprimé en pourcentage du nombre total d'enfants ayant l'âge officiel de suivre des études primaires. Ces données proviennent d'enquêtes nationales sur les ménages.
Enfants atteignant la 5^e année d'études primaires	Pourcentage d'enfants entrés en première année du cycle d'enseignement primaire atteignant la 5 ^e année.
Taux d'alphabétisation des adultes	Nombre de personnes alphabétisées de 15 ans et plus, exprimé en pourcentage de la population de cette catégorie d'âge.
Indice synthétique de fécondité	Nombre d'enfants que mettrait au monde une femme qui vivrait jusqu'à la fin de ses années de procréation en donnant naissance, à chaque âge, au nombre d'enfants correspondant au taux de fécondité pour cet âge.
Soins prénatals	Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans consultées au moins une fois au cours d'une grossesse par des agents de santé qualifiés (médecins, infirmières ou sages-femmes).
Accouchements assistés	Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont accouché dans les deux années précédant l'enquête et dont l'accouchement a eu lieu dans un établissement de santé.
mortalité maternelle : Ratio	Nombre annuel de décès chez les femmes par suite de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, pour 100 000 naissances vivantes.
Risque de décès maternel sur la vie entière	Le risque de décès maternel sur la vie entière tient compte à la fois de la probabilité de tomber enceinte et de la probabilité de mourir des suites de cette grossesse, cumulées pendant toutes les années où une femme est en âge de procréer.
Travail des enfants	Enfants faisant un travail qui leur empêche la réalisation de leurs droits.
Enregistrement des naissances	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui étaient enregistrés au moment de l'enquête. Le numérateur comprend les enfants dont le certificat de naissance a été vu par l'enquêteur ou ceux dont la mère (ou la personne qui s'occupe d'eux) affirme que sa naissance a été enregistrée. Les données MICS se rapportent aux enfants en vie au moment de l'enquête.